

Bloktoets : **1PPG Principes en Praktijk van de Geneeskunde**
Datum : 19 oktober 2016
Aanvang : 10.00 uur

Deze tentamenset kunt u na afloop meenemen

ALGEMENE AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIE:

- Dit tentamen bestaat uit drie onderdelen met in totaal **85** meerkeuzevragen:
Vraag 1 t/m 60 - Vaardigheden acute geneeskunde
Vraag 61 t/m 73 - Geneeskundig proces
Vraag 74 t/m 85 - Psychomotore vaardigheden
- De beschikbare tijd voor het gehele tentamen is **1,5** uur.
- Controleer of uw tentamenset compleet is.
- Vermeld op het antwoordformulier duidelijk uw naam en studentnummer.
- Bij iedere vraag is slechts één alternatief het juiste of het beste.
- U geeft het naar uw mening juiste antwoord aan door het CIJFER voor het betreffende alternatief te omcirkelen.
- Vragen waar u door tijdnood niet aan toekomt, laat u onbeantwoord. Acht u alle alternatieven, na zorgvuldige bestudering, even juist, dan moet u de vraag niet beantwoorden. Kunt u één of meerdere alternatieven elimineren, dan moet u de vraag wel beantwoorden.
- Wanneer u het tentamen beëindigd hebt, dient u uw antwoorden (dus de omcirkelde CIJFERS) zorgvuldig over te brengen op het antwoordformulier, gebruik daarvoor een zwarte of blauwe pen. Corrigeer fouten door een kruisje door het foutieve antwoord te zetten.
- **Als u een vraag wilt open laten vult u het hokje boven het vraagteken “?” in.**
- De op het antwoordformulier ingevulde antwoorden worden beschouwd als uw definitieve antwoorden, ongeacht uw omcirkelingen in uw toetsboekje.
- Meer dan één ingevuld antwoord per vraag wordt als blanco geïnterpreteerd.
- Schrijf niet buiten de invulvelden van het antwoordformulier.
- Het gebruik van alle audiovisuele en technische hulpmiddelen is niet toegestaan, tenzij expliciet vermeld elders op dit voorblad. Mocht u dergelijke apparatuur toch gebruiken, dan zal dit als fraude worden aangemerkt. Op uw tafel mogen uw studenten- en registratiekaart en los schrijfmateriaal liggen. Etui's moeten van tafel.
- *Als u uw antwoordformulier vlegt, vouwt, beschadigt of de invulinstructies negeert kan het niet correct worden verwerkt. **Vraag de surveillant** in dergelijke gevallen om **een nieuw blanco antwoordformulier!** Indien u dit verzuimt zijn de gevolgen daarvan voor uw rekening.*

De vragen worden als volgt gescoord:

antwoorden:	Goed	Fout	open	
2 keuze-vraag	1	-1	0	Punten
3 keuze-vraag	1	-½	0	Punten
4 keuze-vraag	1	-1/3	0	Punten
5 keuze-vraag	1	-¼	0	Punten

Lever na afloop het antwoordformulier in. Indien u commentaar heeft op de vragen, verwijzen we u naar de hyperlink die is opgenomen bij uw toetsindeling in uw webdossier t.b.v. het digitaal studentcommentaarformulier voor deze toets.

LET OP !!

ZET EERST UW NAAM EN STUDENTNUMMER OP HET ANTWOORDFORMULIER!

VEEL SUCCES!

Inhoud van deze toetsset:

Vraag 1 t/m 60 - Vaardigheden acute geneeskunde

Vraag 61 t/m 73 - Geneeskundig proces

Vraag 74 t/m 85 - Psychomotore vaardigheden

Vaardigheden Acute Geneeskunde

1. Het is een koude winterdag en jij zit op een EHBO-post bij een ijshockeywedstrijd. Er komt een kind naar je toe dat al de hele dag heeft staan kijken en nu hele koude handen heeft. Je onderzoekt de handen en constateert dat er sprake is van een eerstegraads bevriezing. Op welk van de onderstaande wijzen mag je de huid **NIET** opwarmen? Dat is:
 1. De handen in een waterbadje (38° C) houden.
 2. De handen onder de oksels houden.
 3. De handen warm wrijven.

2. Stelling: pupilafwijkingen passen **NIET** bij het beeld van een traumatisch schedelhersenletsel. Deze stelling is:
 1. Juist
 2. Onjuist

3. Je treft een slachtoffer aan met een gebroken onderbeen. Wat is nu de beste manier van handelen? Dat is:
 1. 112 bellen.
 2. Het slachtoffer naar de huisarts brengen.
 3. Het slachtoffer naar de spoedeisende hulp brengen.

4. Welke van de onderstaande stellingen is juist met betrekking tot een myocardinfarct? Dat is:
 1. Bij een myocardinfarct is nitroglycerine altijd effectief.
 2. Een myocardinfarct wordt niet gezien in rust.
 3. Een van de oorzaken van een myocardinfarct is atherosclerose.
 4. Uitstraling naar de kaak wijst meer op hyperventilatie dan op een myocardinfarct.

5. Je komt bij een slachtoffer dat heftig hoest en in paniek is. Op basis van dit gegeven is er bij dit slachtoffer in ieder geval zeker **GEEN** sprake van een:
1. Anafylactische reactie.
 2. Inhalatietrauma.
 3. Gedeeltelijke luchtwegobstructie.
 4. Volledige luchtwegobstructie.
6. De posttraumatische amnesie (PTA) bij een matig-ernstig traumatisch hoofd-hersenletsel bedraagt meer dan 24 uur. Deze stelling is:
1. Juist
 2. Onjuist
7. Je loopt over straat en ziet een oudere man op de grond liggen.

Stelling: het eerste dat je nu moet doen is het slachtoffer benaderen en op luide toon vragen: "Hallo meneer. Kunt u mij horen?". Deze stelling is:

1. Juist
2. Onjuist

8. Samen met je nichtje van vier ben je op bezoek bij je oma. Je nichtje is bekend met astma. Zij heeft een tijdje in de tuin zitten spelen. Wanneer ze terugkomt, is zij benauwd en bemerk je een expiratoire stridor. Hoe kun je nu het best handelen? Dat is:
1. Haar met het innemen van haar astmamedicatie helpen en afwachten.
 2. Haar naar de spoedeisende hulp brengen.

9. Welk van de onderstaande vormen van ondersteuning wordt gebruikt bij een letsel aan een sleutelbeen van een volwassene? Dat is:
1. Een brede das.
 2. Een mitella.

10. Stelling: bij het onderdeel 'L' in het acroniem SAMPLE wordt **ALTIJD** gevraagd naar de inname van drank en drugs. Deze stelling is:
1. Juist
 2. Onjuist

11. Tot welk van de onderstaande typen shock kan een harttamponade (bloed in het hartzakje) leiden? Dat is:
1. Een cardiogene shock.
 2. Een distributieve shock.
 3. Een obstructieve shock.
 4. Een restrictieve shock.
12. Welke van de onderstaande handelingen omschrijft het best hoe je moet handelen bij de C van het ABCDE-protocol? Dat is:
1. Je behandelt alle uitwendige bloedingen die je bij het slachtoffer aantreft en controleert de pols, de capillaire refill en huid.
 2. Je behandelt ernstige uitwendige bloedingen en voelt de pols. Als de pols niet normaal is controleer je vervolgens ook nog de capillaire refill en de huid.
 3. Je behandelt ernstige uitwendige bloedingen en controleert de pols, de capillaire refill en de huid.
13. Hoe noemen we de situatie waarin beide pupillen verkleind zijn? Dat is:
1. Afasie.
 2. Asymmetrie.
 3. Mydriasis.
 4. Myosis.
14. Je treft iemand liggend op zijn rug aan na een hoogerenergetisch trauma. Bij Response constateer je dat het slachtoffer buiten bewustzijn is. Aangekomen bij de controle van de Airway voer je de chinlift uit. Deze handeling is op dit moment:
1. Juist
 2. Onjuist
15. Een fietser wordt aangereden door een auto. Als goed EHBO'er snel je te hulp. Bij het controleren van de ademhaling zie je een paradoxale ademhaling. Bij welke diagnose past dit fenomeen? Dat is:
1. Een fladderthorax.
 2. Een pneumothorax.
 3. Een spanningspneumothorax.

16. Welke handeling verricht je bij een slachtoffer met een hypoglycaemie, indien deze bij bewustzijn is? Dat is:
1. Het slachtoffer een glas cola light geven.
 2. Het slachtoffer een boterham geven.
 3. Het slachtoffer insuline laten toedienen.
 4. Zo snel mogelijk een glucagon injectie toedienen aan het slachtoffer.
17. Je treft een bromfietser aan die van zijn brommer is gevallen. Hij droeg geen helm, maar is bij bewustzijn, wanneer je hem benadert. Terwijl je de pols controleert bemerk je dat het bewustzijn van het slachtoffer achteruitgaat. Vervolgens raakt hij bewusteloos. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose bij dit slachtoffer? Dat is:
1. Een epiduraal hematoom.
 2. Een subarachnoïdale bloeding.
 3. Een subduraal hematoom.
18. Een slachtoffer is verbrand in haar gezicht. Het is een tweedegraads brandwond en de verbranding is kleiner dan 1% van haar totale huidoppervlak. Op welke van de onderstaande manieren kun je nu het beste handelen? Dat is:
1. De brandwond van het slachtoffer bedekken met metallinegas en haar vervolgens naar huis sturen.
 2. De brandwond van het slachtoffer bedekken met metallinegas en haar vervolgens doorverwijzen naar het ziekenhuis.
 3. De brandwond van het slachtoffer insmeren met brandzalf en haar vervolgens doorverwijzen naar het ziekenhuis.
 4. Je doet niets. Deze brandwond zal vanzelf genezen.
19. Na een uitgebreide maaltijd met je grootouders besluit je een potje te schaken met je opa. Midden in het spel krijgt hij drukkende pijn op zijn borstbeen met uitstraling naar zijn linkerarm. De spray onder de tong werkt niet en na 20 minuten geeft hij nog steeds pijn aan. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? Dat is:
1. Angina Pectoris.
 2. Een myocardinfarct.
20. Stelling: een patiënt met licht traumatisch hoofd-/hersenenletsel hoeft **NIET** door een arts gezien te worden. Deze stelling is:
1. Juist
 2. Onjuist

21. In welke van de onderstaande situaties wordt de snelle kantelmethode gebruikt? Dat is:
1. Als het slachtoffer braakneigingen vertoont.
 2. Als het slachtoffer een volledige luchtwegobstructie heeft en de Heimlich moet worden uitgevoerd.
 3. Als het slachtoffer per direct gereanimeerd moet worden.
22. Welke van de onderstaande vragen en handelingen past **NIET** bij het onderdeel 'Disability 1' in het protocol? Dat is:
1. Het slachtoffer controleren op anisocorie.
 2. Het slachtoffer vragen naar de locatie waar hij of zij zich momenteel bevindt.
 3. Het slachtoffer vragen of hij of zij buiten bewustzijn is geweest.
 4. Het slachtoffer vragen om zijn of haar tanden te laten zien.
23. Stelling: bij een astmatische patiënt ontstaat benauwdheid onder andere door verhoogde slijmsecretie. Deze stelling is:
1. Juist
 2. Onjuist
24. Stelling: cardiale klachten presenteren zich bij vrouwen vaker atypisch dan bij mannen. Deze stelling is:
1. Juist
 2. Onjuist
25. Welk van de onderstaande letsels is **GEEN** oorzaak van hypovolemische shock? Dat is:
1. Een harttamponade
 2. Ernstige diarree.
 3. Lever- en miltletsel.
 4. 10% verbranding van het lichaamsoppervlak met 2e graads brandwonden.
26. Welke van de onderstaande handelingen is de meest juiste behandeling bij een zuigende verwonding van de thorax? Dat is:
1. Het dakpansgewijs afplakken van de wond, met 1 zijde open.
 2. Het direct uitoefenen van druk op de wond.
 3. Het neerleggen van de patiënt op de aangedane zijde.
 4. Het zo goed mogelijk luchtdicht afplakken van de wond.

27. Wat past **NIET** bij een aanval van astma bronchiale? Dat is:

1. Hoesten
2. Hypoventilatie
3. Kortademigheid
4. Piepende ademhaling

28. Wat is de juiste frequentie van de borstcompressies bij het reanimeren van een volwassene? Dat is:

1. 70 - 90/min.
2. 100 - 120/min.
3. 140 - 160/min.

29. Welk van de onderstaande ongevalsmechanismen is **GEEN** Hoog Energetisch Trauma (HET)? Dat is:

1. Een hardloper die bij een sprint zijn enkel verstuikt.
2. Een val van de eerste verdieping van een huis.
3. Een vrachtauto die met 5 km/h een voetganger aanrijdt.
4. Een wielrenner die met hoge snelheid uit de bocht vliegt en in de berm belandt.

30. Welk van de onderstaande verschijnselen past het **MEEST** bij een epiduraal hematoom? Dat is:

1. Een epiduraal hematoom kenmerkt zich door een lucide interval.
2. Een epiduraal hematoom ontstaat **ALTIJD** subacuuт.
3. Een epiduraal hematoom ontstaat vaak spontaan.
4. Een epiduraal hematoom wordt nog wel eens gezien bij gebruik van bloedverdunners.

31. Je bent op de schaatsbaan aan het schaatsen. Je botst tegen een wat oudere vrouw. Ze valt zeer ongelukkig. Haar linker onderbeen staat in een knikstand.

Hoe kun je nu het best handelen? Dat is:

1. Het getroffen lichaamsdeel zo min mogelijk bewegen.
2. Het linker onderbeen recht leggen.
3. Testen of er asdrukpijn opwekbaar is.

32. Het is een mooie zomerdag en je ligt lekker op het strand, als je neefje van vijf jaar opeens huilend naar je toe komt. Door het harde huilen kom je er niet goed achter wat er aan de hand is, maar je ziet op zijn arm een rood, warm bultje met een zwart puntje in het midden. Op het ontstaan van welk van de onderstaande typen shock moet je bedacht zijn? Dat is:
1. Een anafylactische shock.
 2. Een neurogene shock.
 3. Een septische shock.
33. Welk van de onderstaande symptomen past het **MINST** bij een aanval van hyperventilatie? Dat is:
1. Angst, een gevoel van stikken.
 2. Dyspnoe (benauwdheid).
 3. Een drukkend gevoel op de borst met uitstraling naar de kaak.
 4. Tintelingen rond de mond en in de vingers.
34. Stelling: het coup-letsel is vaak ernstiger dan het contre-coup letsel. Deze stelling is:
1. Juist
 2. Onjuist
35. Stelling: je laat een onderkoeld slachtoffer zijn natte kleding **NIET** uittrekken, omdat dit leidt tot verdere afkoeling. Deze stelling is:
1. Juist
 2. Onjuist
36. Er zijn verschillende oorzaken voor een pneumothorax aan te wijzen. Indien je slachtoffer een jonge, dunne, lange man betreft, dan is de kans het grootst dat het gaat om een:
1. a-traumatische pneumothorax.
 2. latrogene pneumothorax.
 3. traumatische pneumothorax.
37. Welke van de onderstaande diagnoses spoort men op door het uitvragen van Be FAST? Dat is:
1. Een Cerebrovasculair Accident (CVA).
 2. Een epidurale bloeding.
 3. Een subarachnoïdale bloeding (SAB).
- 

38. Een deelnemer van een volleybalwedstrijd gaat naar de EHBO-post. Hij heeft veel last van zijn schouder en geeft aan dat zijn arm 'uit de kom is'. Hij vraagt de EHBO-er om deze te reponeren. Hoe kan de EHBO-er nu het best handelen? Dat is:
1. De schouder reponeren.
 2. Een mitella aanleggen en het slachtoffer naar de SEH sturen.
 3. Een brede das aanleggen en het slachtoffer naar de SEH sturen.
39. Als men de nek heeft gestabiliseerd, geldt dat het slachtoffer zo min mogelijk aangeraakt moet worden. Wanneer mag je het slachtoffer wel aanraken? Dat is:
1. Nooit, wanneer de ambulance is gearriveerd zal het slachtoffer door de ambulancebroeders weer aangeraakt worden, jij als EHBO-er mag dit echter niet.
 2. Voor de C-controle, een zuigende borstwond en grote bloedingen.
 3. Voor de C-controle en het afdekken van alle mogelijke verwondingen (zuigende borstwond, ernstige bloeding, schaafwonden etc.).
40. Stelling: je treft een slachtoffer aan liggend op zijn buik. Mogelijk is er sprake van wervelletsel en je kunt zijn ademhaling niet goed beoordelen. Je mag het slachtoffer op de rug draaien. Deze stelling is:
1. Juist
 2. Onjuist
41. Het is maandagavond. Na een gezellig etentje in de stad loop je richting je huis, wanneer je een vrouw ziet liggen op de stoep. Je rent op haar af en ziet meteen dat er een mes in haar borst steekt. De vrouw is nog bij bewustzijn, maar heeft erge pijn en zij lijkt veel moeite met ademen te hebben. Je denkt meteen aan een spanningspneumothorax. Welke van onderstaande symptomen past hier **NIET** bij? Dat is:
1. Een hoogstaande thoraxhelft die niet beweegt met de ademhaling.
 2. Een paradoxale ademhaling.
 3. Een weke pols en een vertraagde capillaire refill.
 4. Opgezette halsvenen.
42. Een syncope kan op verschillende manieren worden veroorzaakt. Wanneer een syncope optreedt na hevige pijn of emotie is er sprake van:
1. Een vasovagale collaps.
 2. Orthostatische hypotensie.

43. Een oudere man presenteert zich met de volgende klachten: praten met dubbele tong, hongerig, verwardheid, rillen, geeuwen, bleke en klamme huid. Welk van de onderstaande diagnoses is hier het meest waarschijnlijk? Dat is:
1. Dronkenschap.
 2. Hyperventilatie.
 3. Hypoglycaemie.
 4. Syncope.
44. Waarvoor wordt de EMV-score (Glasgow-Coma-Scale) gebruikt? Dat is voor:
1. Het beoordelen of iemand een hypo- of hyperglycaemie heeft.
 2. Het meten van de mate van bewustzijnsdaling.
 3. Het scoren van de ernst van een niet traumatische hersenbloeding.
45. Je hebt bij een slachtoffer met behulp van het ABCDE-protocol een epileptische aanval vastgesteld. Hoe kun je nu het best handelen? Dat is:
1. Ervoor zorgen dat de omgeving van het slachtoffer vrij is van obstakels en de duur van de aanval registreren.
 2. Niets doen, je wacht tot de aanval afgelopen is.
 3. Proberen het slachtoffer in bedwang te houden en iets tussen de tanden te steken om een tongbeet te voorkomen.
46. Welke van de onderstaande structuren in de schedel ligt het dichtste bij het schedeldak (bot)? Dat is:
1. De arachnoidia.
 2. De cortex.
 3. De dura mater.
 4. De pia mater.
47. Op een mooie zomerdag maak je een fietstocht door de bossen bij Malden. Op een rustplaats zit een wat oudere man alleen op een bankje. Je gaat poolshoogte nemen. Het gelaat van de man is grauw en hij zweet. Hij klaagt over een benauwend en pijnlijk gevoel op de borst, waardoor hij is gestopt met fietsen. Bij navraag blijkt het slachtoffer al ruim een kwartier op het bankje te zitten. Hoe kun je nu het best handelen? Dat is:
1. Een omstander een auto laten halen en het slachtoffer naar de SEH brengen.
 2. Nog 10 minuten wachten en het slachtoffer geruststellen.
 3. Vragen of het slachtoffer nitrospray bij zich heeft en dit toedienen.
 4. Zo snel mogelijk 112 waarschuwen.

48. Stelling: het gebruik van een EpiPen bij een slachtoffer met een anafylactische shock leidt tot vermindering van de benauwdheid én verbetering van de bloeddruk. Deze stelling is:
1. Juist
 2. Onjuist
49. Bij welk van de onderstaande letsels is het voorkomen van een brilhematoom het meest waarschijnlijk? Dat is:
1. Een epidurale bloeding.
 2. Een open hersenletsel.
 3. Een schedelbasisfractuur.
 4. Oogletsel.
50. Je bent vrijwilliger van het Rode Kruis tijdens de Nijmeegse Vierdaagse en het is flink warm weer. De wandelaars lopen in de volle zon en je oog valt op een wandelaar die in de berm van de weg ligt. Wanneer je hem aanspreekt valt het je op dat hij niet transpireert. Hij ziet er rood uit. Je voelt een zeer hoge hartslag. Welke van de onderstaande diagnoses is hier het meest waarschijnlijk? Dat is:
1. Een hitteberoerte
 2. Een hyperglycaemie
 3. Een warmtecollaps
51. Je komt aan bij een slachtoffer dat bij een brand hete rook heeft ingeademd, er is geen overig letsel. Het slachtoffer vertelt dat hij helemaal geen klachten heeft en wil zo snel mogelijk naar huis. Wat is nu de juiste wijze van handelen? Dat is:
1. 112 bellen en wachten op de komst van de ambulance.
 2. Het slachtoffer naar de eerste hulp brengen.
 3. Het slachtoffer naar huis laten gaan en adviseren een afspraak bij de huisarts te maken.
52. Welke van de onderstaande diagnoses past het meest bij een snelle weke pols en een rode warme huid? Dat is:
1. Een cardiogene shock.
 2. Een distributieve shock.
 3. Een hypovolemische shock.
 4. Een obstructieve shock.

53. De capillary refill is normaal indien na het indrukken en weer loslaten van het nagelbed de normale kleur terugkomt binnen een bepaalde tijd. Om hoeveel seconden gaat het hier? Dat is:

1. 1 seconde
2. 2 seconden
3. 3 seconden
4. 4 seconden

54. Naar het bestaan van welk van de onderstaande ziektebeelden vraag je in ieder geval bij 'P' van het acroniem 'SAMPLE'? Dat zijn:

1. Allergie, Epilepsie, Hart- en vaatziekten.
2. Astma, Diabetes Mellitus, Epilepsie.
3. Diabetes Mellitus, Epilepsie, Hart- en vaatziekten.

55. Bij enkele acute aandoeningen verdient direct ingrijpen de voorkeur. Dat wil zeggen: handelen terwijl ondertussen wordt begonnen met uitvragen van het protocol DRS.ABCDE. Voor welke van de onderstaande acute aandoeningen geldt dit? Dat is:

1. Een dwarslaesie.
2. Een epiduraal hematoom.
3. Een hypoglycaemie.
4. Een tweedegraads brandwond.

56. Waarvoor staat de S in Be FAST? Dat is:

1. Since.
2. Situation.
3. Speech.
4. Syndromes.



57. Welk van de onderstaande letsels noemen we een coup-contre-coup letsel? Dat is:

1. Een indeuking van het schedelbot.
2. Een schedelbasisfractuur met liquorlekkage.
3. Hersenschade aan twee tegenoverliggende zijden.
4. Twee aangrenzende gebieden met hersenkneuzing.

58. Stelling: bij coma reageert het slachtoffer op aanschudden. Deze stelling is:

1. Juist
2. Onjuist

59. Een huisgenoot heeft een suicidepoging ondernomen door zijn eigen pols in te snijden. Je wilt EHBO verlenen en probeert de bloeding te stelpen. Welke van de onderstaande behandelingen geeft de juiste volgorde van handelen?

Dat is:

1. Kurkmethode, aangedane arm omhoog brengen, afdrukken van de a. brachialis, 112 bellen, wonddrukverband aanleggen.
2. Kurkmethode, aangedane arm omhoog brengen, afdrukken van de a. brachialis, wonddrukverband aanleggen, 112 bellen.
3. Kurkmethode, aangedane arm omhoog brengen, afdrukken van de a. subclavia, wonddrukverband aanleggen, 112 bellen.

60. Op welke van de onderstaande plaatsen dient een arteriële bloeding hoog aan de bovenarm afgedrukt te worden? Dat is aan:

1. De arteria brachialis.
2. De arteria carotis communis.
3. De arteria radialis.
4. De arteria subclavia.



Het geneeskundig proces

Casus bij vraag 61 t/m 64

Op een lagere school heerst kinkhoest. Bram, een leerling uit groep 4, bezoekt de huisarts in verband met heftige hoestbuien. Zijn moeder is bezorgd: Bram slaapt slecht en eet weinig. Het gezin bestaat uit vader, moeder en nog 2 kinderen van 10 weken en 2 jaar. Bram wordt getest op kinkhoest. Deze test blijkt positief te zijn. Kinkhoest is gevaarlijk voor jonge baby's.

Vraag 61

De huisarts vraagt of Bram is afgevallen.

De huisarts vraagt dan naar:

1. de reden van komst;
2. een klacht;
3. een probleem.

Vraag 62

De moeder van Bram wil weten of Bram wel naar school mag op dit moment.

Deze twijfel hoort bij het uiten van:

1. de hulpvraag;
2. een klacht;
3. ziektegedrag.

Vraag 63

De huisarts besluit om naast Bram de rest van het gezin ook te behandelen met antibiotica gericht tegen de kinkhoestbacterie.

De behandeling van de rest van het gezin moet opgevat worden als een:

1. curatieve behandeling;
2. palliatieve behandeling;
3. preventieve behandeling;
4. symptomatische behandeling.



Vraag 64

De huisarts vertelt tegen de moeder van Bram dat de hoestbuien nog wel enige weken kunnen aanhouden.

Welke fase in het consult betreft dit?

1. De beleidsfase.
2. De onderzoeksfase.
3. De vraagverheldering.

Vraag 65

De heer Roelofs bezoekt zijn huisarts in verband met aanhoudende winderigheid. Bij navraag blijkt dat hij zich ontzettend schaamt voor deze kwaal en dat hij zich daardoor ziek heeft gemeld op het werk. Hij drinkt erg veel kamilletee omdat hij op internet gelezen had dat daarmee de darmflora verbetert.

Aan welk aspect van het SCEGS-model refereert het zich ziek melden op het werk?


1. Cognitie.
2. Emotie.
3. Gedrag.

Vraag 66

Een consult kenmerkt zich door verschillende fasen, waaronder de fase van de vraagverheldering.

Wie staat of staan centraal in de vraagverhelderingsfase van een consult?

1. De arts.
2. De arts en de patiënt beiden.
3. De patiënt.



Casus bij vraag 67 t/m 73

Meneer Zwartjes, 45 jaar, komt bij de huisarts en vertelt dat hij sinds vannacht erg veel pijn heeft in zijn rug. Hij heeft de laatste jaren regelmatig het spreekuur bezocht met rugklachten. Deze keer is de pijn echter veel heftiger. De huisarts overweegt een rughernia. Dit is een beschadiging van de tussenwervelschijf met als gevolg beklemming en uitval van zenuwen die naar de benen lopen.

Meneer Zwartjes is tegelzetter van beroep. In zijn vrije tijd is hij veel bezig met voetbal en ook de 3e helft spreekt hem aan. Hij is regelmatig dronken.

Vraag 67

Welke dimensie van de pijnklacht is aan de orde als de huisarts nu uitvraagt of de klachten zijn ontstaan na het voetballen of na het werken?

1. De context.
2. De kwaliteit.
3. De kwantiteit.
4. Het tijdsverloop.

Vraag 68

De huisarts vraagt of de pijn uitstraalt naar de kuit van meneer Zwartjes.

Deze vraag hoort bij de:

1. speciële anamnese;
2. tractusanamnese.

Vraag 69

Tot welke tractus behoort de vraag naar uitstraling van de pijn van de rug naar de kuit?

1. De algemene tractus;
2. De tractus locomotorius;
3. De tractus neurologicus;
4. De tractus van de huid.

Vraag 70

De huisarts overweegt een hernia en stuurt de patiënt naar een specialist. Deze besluit om een MRI aan te vragen.

Hoe wordt deze fase in het diagnostisch proces genoemd?

1. Deductie.
2. Inductie.



Vraag 71

Een huisarts schrijft het middel ibuprofen voor als pijnstillер. De patiënt mag deze medicatie vier keer per dag gebruiken.

Deze behandeling is een:

1. curatieve behandeling;
2. palliatieve behandeling;
3. preventieve behandeling;
4. symptomatische behandeling.

Vraag 72

Men spreekt wel van 'de IJsberg van morbiditeit'? Dit betekent dat het grootste deel van alle optredende problemen, klachten en ziekten

1. niet leidt tot ernstige last of schade voor de patiënt.
2. niet onder de aandacht komt van een arts.

Vraag 73

De cirkel van het klinisch redeneren bestaat uit drie fases. Welke fase hoort niet thuis in deze cirkel?

1. De behandelfase
2. De curatieve fase
3. De evaluatie fase



Psychomotore vaardigheden

Vraag 74

Wie wordt wel gezien als de vader van de geneeskunde?

1. Aesculaef
2. Boerhaave
3. Hippocrates
4. Laennec

Vraag 75

De renaissance-tijd wordt over het algemeen gezien als de startperiode van de academische geneeskunde. Welk van onderstaande gebruiken behoorde in die tijd tot de diagnostische procedures?

1. Iriscopie
2. Frenologie
3. Piskijken

Vraag 76

Bij het gebruik van een te brede bloeddrukband wordt de bloeddruk niet goed gemeten. De waarde die dan wordt gemeten is waarschijnlijk:

1. te hoog.
2. te laag.

Vraag 77

Bij een patiënt wordt de bloeddruk in de spreekkamer bij herhaling gemeten en die bedraagt ongeveer 160/90 mmHg. Patiënt heeft echter een goede bloeddrukmeter thuis en meet daar gemiddeld 140/80 mmHg. De arts laat patiënt de meter een keer meenemen en meet wederom in de spreekkamer met zowel de meter van patiënt, als de handmatige meter, weer een hoge bloeddruk. In de behandeling van de bloeddruk kan de arts het best vertrouwen op:

1. de handmatige meting in de spreekkamer.
2. de thuismetingen.

Vraag 78

Het meest distale gedeelte van het sternum is het

1. Corpus.
2. Manubrium.
3. Processus xiphoideus.

Vraag 79

Ter hoogte van het manubriosternale gewricht bevindt zich de

1. eerste rib.
2. tweede rib.
3. derde rib.

Vraag 80

De diaphragmakoepel bevindt zich ter hoogte van

1. Th 6.
2. Th 8.
3. Th 10.

Vraag 81

Op onderstaande afbeelding bevindt de midclaviculairlijn zich bij:

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4



Vraag 82

Op onderstaande afbeelding bevindt zich bij 4

1. de spina iliaca anterior superior.
2. het acromion.
3. het manubrium sterni.
4. het os pubis.



Vraag 83

De voorste okselplooi, bij de voorste axillairlijn, wordt gevormd door de musculus

1. Latissimus dorsi.
2. Pectoralis major.
3. Serratus anterior.

Vraag 84

De mitralisklep kun je het beste beluisteren bij de

1. tweede intercostaal ruimte links.
2. tweede intercostaal ruimte rechts.
3. vijfde intercostaal ruimte links.

Vraag 85

Tijdens het lichamelijk onderzoek palpeer je de arteriën. Voor welke arterie leg je je vingers parallel aan en lateraal van de pezen van je vingerflexoren aan de volaire zijde van de pols?

1. arteria brachialis
2. arteria radialis
3. arteria ulnaris