

2



Bloктоets : 5BOSA2 Vaardigheden Acute Geneeskunde 2e bloктоets  
Datum : 18 maart 2013  
Aanvang : 19.00 uur  
**Deze tentamenset kunt u na afloop meenemen**

ALGEMENE AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIE:

- Dit tentamen bestaat uit 70 meerkeuzevragen.
- De beschikbare tijd voor het gehele tentamen is 2 uur.
- Controleer of uw tentamenset compleet is.
- Vermeld op het antwoordformulier duidelijk uw naam en studentnummer.
- Bij iedere vraag is slechts één alternatief het juiste of het beste.
- U geeft het naar uw mening juiste antwoord aan door het CIJFER voor het betreffende alternatief te omcirkelen.
- Vragen waar u door tijdnood niet aan toekomt, laat u onbeantwoord. Acht u alle alternatieven, na zorgvuldige bestudering, even juist, dan moet u de vraag niet beantwoorden. Kunt u één of meerdere alternatieven elimineren, dan moet u de vraag wel beantwoorden.
- Wanneer u het tentamen beëindigd hebt, dient u uw antwoorden (dus de omcirkelde CIJFERS) zorgvuldig over te brengen op het antwoordformulier, gebruik daarvoor een HB-potlood. Corrigeer fouten met gum. Verwijder gumresten zorgvuldig van uw antwoordformulier.
- Als u een vraag wilt open laten vult u het hokje boven het vraagteken "?" in.
- De op het antwoordformulier ingevulde antwoorden worden beschouwd als uw definitieve antwoorden, ongeacht uw omcirkelingen in uw toetsboekje.
- Meer dan één ingevuld antwoord per vraag wordt als blanco geïnterpreteerd.
- Schrijf niet buiten de invulvelden van het antwoordformulier.
- Het gebruik van alle audiovisuele en technische hulpmiddelen is niet toegestaan, tenzij expliciet vermeld elders op dit voorblad. Mocht u dergelijke apparatuur toch gebruiken, dan zal dit als fraude worden aangemerkt. Op uw tafel mogen uw studenten- en registratiekaart en los schrijfmateriaal liggen. Etui's moeten van tafel.
- Als u uw antwoordformulier vlekt, vouwt, beschadigt of de invulinstructies negeert kan het niet correct worden verwerkt. Vraag de surveillant in dergelijke gevallen om een nieuw blanco antwoordformulier! Indien u dit verzuimt zijn de gevolgen daarvan voor uw rekening.

De vragen worden als volgt gescoord:

antwoorden:	Goed	Fout	open	
2 keuze-vraag	1	-1	0	Punten
3 keuze-vraag	1	- 1/2	0	Punten
4 keuze-vraag	1	- 1/3	0	Punten
5 keuze-vraag	1	- 1/4	0	Punten

Indien u commentaar heeft op de vragen, noteert u dat op het commentaarformulier (laatste blz.) en levert u dat na afloop van het tentamen in, tezamen met uw antwoordformulier. Voor het overige mag u de volledig ter hand gestelde tentamenset behouden.

LET OP !!

ZET EERST UW NAAM EN STUDENTNUMMER OP HET ANTWOORDFORMULIER!

VEEL SUCCES!

Versie 2 Vraag	Omschrijving
1	<p>Bij een astmatische patiënt ontstaat benauwdheid door contraheren van glad spierweefsel in de bronchiën. Deze stelling is:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Juist</li> <li>2. Onjuist</li> </ol>
2	<p>Bij een tekenbeet bestaat er een kans dat de teek de ziekte van Lyme overbrengt, als deze zelf besmet is met een bacterie (<i>B. burgdorferi</i>). Daarom is het verstandig om vóór het verwijderen van de teek de plaats van de beet te ontsmetten. Deze stelling is:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Juist</li> <li>2. Onjuist</li> </ol>
3	<p>Waarvoor staat de S in Be FAST? Dat is:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Since</li> <li>2. Situation</li> <li>3. Speech</li> <li>4. Syndromes</li> </ol>
4	<p>Samen met je neefje van vijf (bekend met astma) ben je op bezoek bij je oma. Hij heeft een tijdje op de zolder zitten spelen. Wanneer hij terugkomt, is hij benauwd en bemerk je een inspiratoire stridor. Wat is nu geïndiceerd?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Je brengt hem naar de spoedeisende hulp</li> <li>2. Je helpt hem met het innemen van zijn astmamedicatie en wacht af.</li> </ol>
5	<p>Je komt, nadat je mogelijk gevaarlijke situaties hebt uitgesloten, bij een slachtoffer en stelt jezelf voor. Het eerstvolgende wat je nu moet doen is:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De luchtweg controleren</li> <li>2. Een omstander bij je roepen die je kan bijstaan</li> <li>3. Het slachtoffer naar een beschutte plek verplaatsen</li> <li>4. Nagaan wat er is gebeurd en wat het slachtoffer mankeert</li> </ol>
6	<p>Je komt als EHBO'er bij een slachtoffer. Het slachtoffer voelt zich ziek, is misselijk, ademt snel en oppervlakkig en bij controle van de C voelt de pols snel en week. De capillaire refill is normaal en de huid is droog en warm. Je stelt bij dit slachtoffer een shocktoestand vast. Om welke soort shock gaat het hier?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cardiogene shock</li> <li>2. Distributieve shock</li> <li>3. Hypovolemische shock</li> <li>4. Obstructieve shock</li> </ol>
7	<p>Welk van de onderstaande structuren in de schedel ligt het dichtste bij het schedeldak (bot)? De:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arachnoidia</li> <li>2. Cortex</li> <li>3. Dura mater</li> <li>4. Pia mater</li> </ol>
8	<p>Je bent je huis aan het renoveren en de klusjesman is in de kamer naast jou aan het werk. Op een gegeven moment hoor je een harde bons en je gaat polshoogte nemen. Je vindt de klusjesman naast een om gevallen keukentrapje op zijn buik op de grond liggend. Je hebt DRS van het protocol doorlopen en hebt geconstateerd dat het slachtoffer buiten bewustzijn is. Tijdens de ABC controles (geen stoornissen in ABC gevonden) is de klusjesman weer bijgekomen. Hij geeft aan dat hij hoofdpijn heeft en misselijk is. Bij het uitvragen van de D valt je verder op dat de klusjesman meerdere keren vraagt hoe hij toch op de grond terecht is gekomen. Bij de E kom je er achter dat de klusjesman ook pijn aan zijn rechterpols heeft. Je besluit deskundige hulp voor de klusjesman in te schakelen. Het beste kun je:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 112 bellen.</li> <li>2. Met de klusjesman naar de eerste hulp gaan.</li> <li>3. Met de klusjesman naar de huisarts gaan.</li> </ol>

9	Adem die ruikt naar aceton is typerend voor: 1. Een hyperglycaemie 2. Een hypoglycaemie 3. Een intoxicatie met blauwzuurgas
10	Een bewusteloos slachtoffer met een fladderthorax moet zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Er is niemand in de buurt dus je moet zelf de ambulance gaan bellen. Je baalt ontzettend want je telefoon is gisteren stuk gegaan en je hebt nog geen nieuwe. Je moet dus weg om 112 te gaan bellen. Wat doe je met het slachtoffer? 1. Je legt hem/haar in stabiele zijligging met de aangedane zijde boven 2. Je legt hem/haar in stabiele zijligging met de aangedane zijde onder
11	Tot hoeveel dagen na de tekenbeet kan de rode kring op de huid, passend bij de ziekte van Lyme, zich nog ontwikkelen? 1. 1 week na de beet. 2. 1-3 weken na de beet. 3. 1-6 weken na de beet. 4. 3 maanden na de beet.
12	Bij een letsel aan een sleutelbeen van een volwassene wordt gebruikt: 1. Een brede das 2. Een mitella
13	Waarvoor staat de M in SAMPLE? 1. Meal 2. Mechanism of injury 3. Medication 4. Monitoring
14	Hoe wordt bewusteloos slachtoffer met een pneumothorax in de stabiele zijligging gelegd? 1. Op de aangedane zijde 2. Op de gezonde zijde 3. Een slachtoffer met pneumothorax mag niet in stabiele zijligging worden gelegd.
15	Je komt bij een bewusteloos slachtoffer aan en begint met het protocol. Als je bij de B komt, constateer je dat het slachtoffer niet meer ademt. Je wil gaan reanimeren maar deze man heeft heel erg veel bloed in en om zijn mond en je vindt dat het gevaarlijk is voor jezelf om te gaan beademen. Wat moet je doen? 1. Je gaat normaal reanimeren; compressies en beademingen 2. Je gaat reanimeren maar je slaat de beademingen over, je wacht tussendoor gewoon de tijd die je normaal zou gebruiken voor de beademingen 3. Je gaat reanimeren zonder beademingen maar je blijft continu compressies geven
16	Welk van de volgende symptomen past <b>NIET</b> bij een hypoglycaemie? 1. Honger 2. Hyperventilatie en geeuwen (slaperigheid) 3. Klamme bleke huid 4. Trage pols
17	Zuurstoftransport kan worden verstoord door een circulatiestilstand. Deze stelling is: 1. Juist 2. Onjuist
18	Als je 112 belt, geef je altijd door of het om een kind of een volwassene gaat. Deze bewering is: 1. Juist 2. Onjuist
19	Hoe lang moet bij de behandeling van weke delen letsel (letsel aan spieren, pezen, ligamenten) minimaal gekoeld worden? 1. 15 minuten 2. 20 minuten 3. 30 minuten

20	<p>Een oudere vrouw valt en blijft stil liggen. Om te kijken of dit slachtoffer nog aanspreekbaar is, moet je als eerste</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Een pijnprikkel toedienen in de vinger</li> <li>2. Het slachtoffer heen en weer schudden</li> <li>3. Jezelf voorstellen en het slachtoffer vragen wat er is gebeurd</li> <li>4. Knijpen in de schouders</li> </ol>
21	<p>Een slachtoffer heeft tijdens klussen in huis verf in zijn oog gekregen. Uw eerste behandeling is:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het oog afdekken met een steriel gaasje</li> <li>2. Het oog laten tranen</li> <li>3. Spoelen van het oog met melk</li> <li>4. Spoelen van het oog met water</li> </ol>
22	<p>Op het schoolplein van een basisschool loopt een van de kinderen tegen een klimrek aan waarbij een tand afbreekt. De afgebroken tand moet bewaard worden in:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bier</li> <li>2. Melk</li> <li>3. Water</li> </ol>
23	<p>Als een slachtoffer na een ongeval met een bromfiets aan het hoofd een verschil in pupilgrootte heeft, welke van de onderstaande letsels is dan het meest waarschijnlijk? Dat is een:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Epiduraal hematoom</li> <li>2. Subarachnoïdale bloeding</li> <li>3. Transient Ischemic Attack</li> </ol>
24	<p>Je bent in een restaurant. Iemand aan de tafel naast je dreigt te stikken in een stuk brood. Jij past adequaat eerste hulp toe, maar je handelingen mogen niet baten en het slachtoffer valt bewusteloos op de grond. Je belt 112 en start reanimatie.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Je start met 30 thoraxcompressies</li> <li>2. Je start met 30 thoraxcompressies, doet een mondinspectie</li> <li>3. Je start met 30 thoraxcompressies, doet een mondinspectie en beademt 2 keer</li> <li>4. Je start met 30 thoraxcompressies en beademt 2 keer</li> </ol>
25	<p>Bij een deel van de bevolking kan na een insectenbeet een hevige lokale reactie ontstaan. Dit wordt gekenmerkt door een uitgebreid rood, warm, gezwollen gebied wat erg jeukt. Deze reactie is:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gevaarlijk: de toxines die vrijkomen bij een wespensteek kunnen in de bloedbaan terecht komen en een sepsis veroorzaken.</li> <li>2. Gevaarlijk: dit duidt op een voorstadium van een anafylactische schok en direct gebruik van de EpiPen is hierbij geïndiceerd.</li> <li>3. Ongevaarlijk: deze reactie is niet gevaarlijk, maar kan wel vervelend/hinderlijk zijn.</li> </ol>
26	<p>Bloedingen kunnen pulseren (stralen met tussenpozen van geen bloed) of continu vloeien. Tot de pulserende bloedingen behoren:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arteriële bloedingen</li> <li>2. Spataderlijke bloedingen</li> </ol>
27	<p>Wat is het beoogde effect van hartmassage bij het reanimeren?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compressie van de longen</li> <li>2. Leegdrukken van het hart</li> <li>3. Vullen van de beide venae cavae</li> </ol>
28	<p>Iris was met haar hond in het bos aan het wandelen. Eenmaal terug ziet haar vader dat er een soort spinnetje in haar nek zit. Haar vader denkt dat het een teek is en adviseert Iris naar de huisarts te gaan. Is het nodig dat Iris naar de huisarts gaat?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ja: een teek kan de ziekte van Lyme overbrengen en het is altijd goed om voor controle even langs te gaan.</li> <li>2. Nee: als een teek minder dan 24 uur aanwezig is, is de kans op het overbrengen van de ziekte van Lyme erg klein.</li> </ol>

29	<p>Wat is de normale polsfrequentie van een volwassene in rust?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 30-50/minuut</li> <li>2. 40-60/minuut</li> <li>3. 60-80/minuut</li> <li>4. 80-100/minuut</li> </ol>
30	<p>Je bent aan het golfen. Je ziet dat het even verderop niet goed gaat met een oudere man. Deze man klaagt over pijn op de borst die uitstraalt naar zijn linkerarm. Je vindt het lastig om te differentiëren tussen angina pectoris en myocardinfarct. Welke van de volgende beweringen is juist:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bij een myocardinfarct is nitroglycerine niet effectief en dient direct 112 gebeld te worden.</li> <li>2. Een aanval van angina pectoris duurt langer dan 15 minuten, nitroglycerine is wel effectief.</li> <li>3. Een myocardinfarct treedt meestal op bij inspanning, het geven van nitroglycerine is wel effectief.</li> </ol>
31	<p>Wat is waar over het beeld van de pneumothorax?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De exogene vorm kan optreden als gevolg van een reanimatie</li> <li>2. De pijn zit niet in de thorax maar in de schouder</li> <li>3. De spontane vorm zie je vaker bij kleine, adipeuze vrouwen</li> <li>4. Heeft soms een ernstige verstoring van de gaswisseling tot gevolg</li> </ol>
32	<p>Je komt bij een slachtoffer, wiens trui in brand staat. Je hebt geen stromend leidingwater bij de hand. Wat is <b>GEEN</b> goede manier om de vlammen te doven? Dit is:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De zilver-gouden reddingsdeken omslaan</li> <li>2. Het gebruik van slootwater om de vlammen te doven</li> <li>3. Het slachtoffer laten rollen over de grond</li> </ol>
33	<p>Een huisgenoot heeft een suicidepoging ondernomen en heeft zijn pols doorgesneden. Je wilt EHBO verlenen en probeert de bloeding te stelpen. Wat moet je doen?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurkmethode, aangedane arm omhoog brengen, afdrukken van de a. brachialis, 112 bellen, wonddrukverband aanleggen</li> <li>2. Kurkmethode, aangedane arm omhoog brengen, afdrukken van de a. brachialis, wonddrukverband aanleggen, 112 bellen</li> <li>3. Kurkmethode, aangedane arm omhoog brengen, afdrukken van de a. subclavia, wonddrukverband aanleggen, 112 bellen</li> </ol>
34	<p>Er komt een slachtoffer bij je op de EHBO-post. Ze is gevallen bij het ijshockeyen en heeft sindsdien hevige pijn aan haar enkel. Ze wordt gedragen en kan absoluut niet op haar voet staan. Je denkt dat haar enkel misschien gebroken is. Wat moet je doen?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Je laat de schaats aan, als de enkel gebroken is kan deze als spalk dienen.</li> <li>2. Je trekt haar schaats uit om de enkel te onderzoeken.</li> </ol>
35	<p>De aanwezigheid van Battle's sign bij een slachtoffer duidt op:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Een cervicale dwarslaesie</li> <li>2. Een intoxicatie</li> <li>3. Een schedelbasisfractuur</li> <li>4. Een subduraal hematoom</li> </ol>
36	<p>Bij angina pectoris treedt er schade op aan de hartspier. Deze stelling is:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Juist</li> <li>2. Onjuist</li> </ol>
37	<p>Een oudere man presenteert zich met de volgende klachten: praten met dubbele tong, hongerig, verwardheid, rillen, geeuwen, bleke en klamme huid. Welk van de onderstaande ziektebeelden is het meest waarschijnlijk?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dronkenschap</li> <li>2. Hyperventilatie</li> <li>3. Hypoglycaemie</li> <li>4. Syncope</li> </ol>

38	<p>Tijdens het klussen aan je nieuwe kamer krijg je een splinter in je oog. Je schreeuwt het uit van de pijn en de vriendin met wie je aan het klussen bent ziet de splinter zitten. Wat moet je nu doen?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Splinter eruit halen, oog afdekken met een plastic bekertje en naar SEH gaan.</li> <li>2. Splinter eruit halen, oog afdekken met een steriel gaasje en naar de SEH gaan.</li> <li>3. Splinter laten zitten, oog afdekken met een plastic bekertje en naar de SEH gaan.</li> <li>4. Splinter laten zitten, oog afdekken met een steriel gaasje en naar huisarts gaan.</li> </ol>
39	<p>De volgende blaren mogen worden doorgeprikt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bevriezingsblaren</li> <li>2. Brandblaren</li> <li>3. Drukblaren</li> <li>4. Geen enkele blaas mag worden doorgeprikt</li> </ol>
40	<p>Indien een slachtoffer een ernstige bloeding heeft aan de bovenarm, dan drukken we deze af aan de:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arteria antebraachii</li> <li>2. Arteria brachialis</li> <li>3. Arteria jugularis</li> <li>4. Arteria subclavia</li> </ol>
41	<p>Een slachtoffer heeft een femurschachtfractuur. Van deze fractuur kan het slachtoffer in shock raken. Deze stelling is:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Juist</li> <li>2. Onjuist</li> </ol>
42	<p>Een slachtoffer heeft een rode huid met blaren en reageert steeds minder op aanspreken. Welke van onderstaande diagnoses is juist?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Distributieve shock</li> <li>2. Hyperglycemie</li> <li>3. Hypovolemische shock</li> <li>4. Warmtecollaps</li> </ol>
43	<p>De capillary refill is normaal indien na het indrukken en weer loslaten van het nagelbed de normale kleur terugkomt binnen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 seconde</li> <li>2. 2 seconden</li> <li>3. 4 seconden</li> <li>4. 5 seconden</li> </ol>
44	<p>Bij enkele acute aandoeningen verdient direct ingrijpen de voorkeur. Dat wil zeggen: handelen terwijl ondertussen wordt begonnen met uitvragen van A, B etc. Een acute aandoening waarvoor dit geldt is:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Een dwarslaesie</li> <li>2. Een epiduraal hematoom</li> <li>3. Een hypoglycaemie</li> <li>4. Een tweedegraads brandwond</li> </ol>
45	<p>Voor het bepalen van de grootte van het verbrande oppervlak van de huid, wordt de regel van negen gebruikt. Wat is juist volgens deze regel?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De arm van een baby is 14 %, de arm van een volwassene is 9%</li> <li>2. Het been van een volwassene is 18%, het been van een baby is 18%</li> <li>3. Het hoofd van een baby is 18%, de romp van een volwassene 27%</li> <li>4. Het hoofd van een volwassene is 9%, de romp van een baby is 36%</li> </ol>
46	<p>Bij één type shock mogen de benen <u>NIET</u> omhoog worden gelegd. Dit is bij de:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cardiogene shock</li> <li>2. Distributieve shock</li> <li>3. Hypovolemische shock</li> <li>4. Obstructieve shock</li> </ol>

47	<p>Hoe moet je handelen bij de C van het protocol?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Je behandelt alle uitwendige bloedingen die je bij het slachtoffer aantreft en controleert de pols, de capillaire refill en huid.</li> <li>2. Je behandelt ernstige uitwendige bloedingen en voelt de pols. Als de pols niet normaal is controleer je vervolgens ook nog de capillaire refill en de huid.</li> <li>3. Je behandelt ernstige uitwendige bloedingen en controleert de pols, de capillaire refill en de huid.</li> </ol>
48	<p>De reanimatie van een drenkeling begint met 5 beademingen. Deze stelling is:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Juist</li> <li>2. Onjuist</li> </ol>
49	<p>Bij een anafylactische reactie is sprake van contractie van gladde spiercellen. Deze stelling is:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Juist</li> <li>2. Onjuist</li> </ol>
50	<p>U komt bij een slachtoffer dat naar zijn keel grijpt, in paniek lijkt, hoest en rood wordt. Wat moet u doen?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. U moedigt aan te blijven hoesten</li> <li>2. Vijf Heimlich, dan vijf rugslagen. Dit herhaalt u tot het in uw ogen niet meer nodig is (bijvoorbeeld omdat het slachtoffer aangeeft zelf weer makkelijk te kunnen ademen).</li> <li>3. Vijf rugslagen, dan vijf Heimlich. Dit herhaalt u tot het in uw ogen niet meer nodig is (bijvoorbeeld omdat het slachtoffer aangeeft zelf weer makkelijk te kunnen ademen).</li> </ol>
51	<p>Indien een slachtoffer na een HET geen tekenen heeft van hersen-/wervelletsel, mag je hem rechtop laten zitten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Juist</li> <li>2. Onjuist</li> </ol>
52	<p>Welke arterie moet worden afgedrukt bij een bloeding in het bovenbeen?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aorta</li> <li>2. Arteria femoralis communis</li> <li>3. Arteria iliaca</li> <li>4. Arteria poplitea</li> </ol>
53	<p>Zuurstoftransport kan worden verstoord door een ademstilstand. Deze stelling is:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Juist</li> <li>2. Onjuist</li> </ol>
54	<p>Als er sprake is van een HET bij een bewusteloos slachtoffer moet je een ambulance bellen. Deze stelling is:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Juist</li> <li>2. Onjuist</li> </ol>
55	<p>Uit hoeveel leden bestaat een helikoptergebonden Mobiel Medisch Team?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 persoon</li> <li>2. 2 personen</li> <li>3. 3 personen</li> <li>4. 4 personen</li> </ol>
56	<p>Het contre-coup letsel is vaak ernstiger dan het coupletsel. Deze uitspraak is</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Juist</li> <li>2. Onjuist</li> </ol>
57	<p>Je bent je huis aan het renoveren en de klusjesman is in de kamer naast jou aan het werk. Op een gegeven moment hoor je een harde bons en je gaat polshoogte nemen. Je vindt de klusjesman naast een omgevallen keukentrapje op zijn buik op de grond. Je hebt DRS van het protocol doorlopen en hebt geconstateerd dat het slachtoffer buiten bewustzijn is. Tijdens de ABC-controles (geen stoornissen in ABC gevonden) is de klusjesman weer bijgekomen. Hij geeft aan dat hij hoofdpijn heeft en misselijk is. Bij het uitvragen van de D valt je verder op dat de klusjesman meerdere keren vraagt hoe hij toch op de grond terecht is gekomen. Er is hoogst waarschijnlijk sprake van:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Licht traumatisch hoofd-/hersenletsel</li> <li>2. Matig ernstig hoofd-/hersenletsel</li> </ol>

58	Een fietser wordt aangereden door een auto. Als goed EHBO'er snel je te hulp. Bij het controleren van de ademhaling zie je een paradoxale ademhaling. Dit past het beste bij een: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fladderthorax</li> <li>2. Pneumothorax</li> <li>3. Spanningspneumothorax</li> </ol>
59	Wat is er aan de hand bij een syncope? Het slachtoffer: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Heeft licht traumatisch hoofd-/hersenletsel</li> <li>2. Heeft een whiplash</li> <li>3. Hyperventileert</li> <li>4. Valt flauw</li> </ol>
60	Licht traumatisch hoofd-/hersenletsel stond eerder bekend als commotio cerebri. Deze stelling is: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Juist</li> <li>2. Onjuist</li> </ol>
61	Na hoeveel minuten circulatiestilstand kan onherstelbare schade optreden in de hersenen? Na: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2 minuten</li> <li>2. 4 minuten</li> <li>3. 6 minuten</li> <li>4. 8 minuten</li> </ol>
62	Borstcompressies bij volwassenen worden als volgt uitgevoerd: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 100-120 maal per minuut; 5 tot 6 cm indrukken</li> <li>2. 80-100 maal per minuut; 5 tot 6 cm indrukken</li> <li>3. 100-120 maal per minuut; 4 tot 5 cm indrukken</li> <li>4. 80-100 maal per minuut; 4 tot 5 cm indrukken</li> </ol>
63	Je bent bij je oom op bezoek. Hij is bekend met suikerziekte. Hij geeft aan zich zwak en trillerig te voelen en ziet wat bleek. Het valt je op dat hij de hele tijd zit te geeuwen. Wat doe je? <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Je brengt je oom naar de spoedeisende hulp</li> <li>2. Je geeft je oom een kopje thee met suiker en een boterham</li> <li>3. Je laat je oom insuline spuiten</li> </ol>
64	De posttraumatische amnesie (PTA) bij een matig-ernstig traumatisch hoofd-hersenletsel bedraagt meer dan 24 uur. Deze stelling is: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Juist</li> <li>2. Onjuist</li> </ol>
65	Op een mooie zomerdag maak je een fietstocht door de bossen bij Malden. Op een rustplaats zit een wat oudere man alleen op een bankje. Omdat je het niet vertrouwt ga je polshoogte nemen. Het gelaat van de man is grauw en hij zweet. Hij klaagt over een benauwend en pijnlijk gevoel op de borst, waardoor hij is gestopt met fietsen. Bij navraag blijkt het slachtoffer al ruim een kwartier op het bankje te zitten. Wat moet je als eerste doen? Je moet: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Een omstander een auto laten halen en het slachtoffer naar de SEH brengen</li> <li>2. Nog 10 minuten wachten en het slachtoffer geruststellen</li> <li>3. Vragen of het slachtoffer nitrospray bij zich heeft en dit toedienen</li> <li>4. Zo snel mogelijk 112 waarschuwen</li> </ol>
66	Op zaterdagochtend zit je in de snackbar en plotseling valt je oog op een vrouw met een agonale ademhaling. Welke handeling is nu geïndiceerd? <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De heimlichmanoeuvre</li> <li>2. Het slachtoffer in een zakje laten ademen</li> <li>3. Het slachtoffer reanimeren</li> <li>4. Geen van bovenstaande antwoorden</li> </ol>



67	Het controleren van de pols bij een bewusteloos slachtoffer gebeurt aan de: 1. Arteria brachialis 2. Arteria carotis 3. Arteria radialis 4. Arteria subclavia
68	Maartje heeft met volleybal haar enkel gebroken. Het is zomer en ze ligt met haar been omhoog in de tuin. Op een gegeven moment vliegt een wesp door haar broekspijp naar binnen. Haar moeder in de keuken hoort geschreeuw en komt naar buiten gerend. Bij een wespensteek: 1. Haal je door middel van een krabbende beweging de angel eruit. 2. Laat je de angel zitten omdat je anders meer kans hebt dat je het gifpompje leegdrukt. 3. Zit er geen angel op de plaats van de steek.
69	Een jonge vrouw van 25 jaar meldt zich bij de EHBO-post met benauwdheid en pijn op de borst. Welk van de onderstaande klachten wijst het meest in de richting van hyperventilatie? 1. Angst 2. Kortademigheid 3. Tintelingen in de vingers van de linker hand 4. Transpiratie
70	Bij een astmatische patiënt ontstaat benauwdheid door verhoogde slijmsecretie. Deze stelling is: 1. Juist 2. Onjuist



**COMMENTAARFORMULIER van het tentamen: 5BOSA2 Vaardigheden Acute Geneeskunde  
2e bloktoets d.d. 18 maart 2013 VERSIE 2**

**VRAAG- NAAM:  
NR.**

**STUD.NR.:**

